

# 臨時営農情報<第5報>

平成29年9月20日

低温・日照不足被害対策本部

## 水 稻

熟色や稔実程度をよく観察し、適期に刈取りしましょう。  
適期刈取りと適正な乾燥調製で良質米生産に努めましょう。

### 刈取適期の判断の目安

項目	判断の目安
出穂後日数	中生品種は出穂後 45～50 日頃
出穂後積算気温	中生品種は平均気温の積算が 960℃に達した時期
籾の黄化程度	ほ場全体の籾が 90%程度黄化した時期
青未熟粒の混入割合	玄米(1.9mm 選別)中に占める青未熟粒歩合が 10%程度まで減少した時期
枝梗の黄化程度	枝梗の3分の2程度が黄化した時期
籾水分	籾水分 25～26%程度まで減少した時期

### 出穂期別の積算気温による刈取り時期の目安

	出穂期	刈取始期 (960℃到達予想日)	刈取終期 (1,200℃到達予想日)
三沢	8/11	9/29	10/15
六戸	8/8	9/26	10/11

※刈取り時期が遅れすぎると茶米等による品質低下が発生するため注意が必要である。

### (1) 水稻共済被害申請受付

受付場所	受付日	受付時間	予備日
JAおいらせ三沢本店 2階	9月21日(木)	9:30～12:00	9月22日 (共済組合受付)

### (2) 共済組合による調査

区分	三沢市	六戸町	飼料米
悉皆調査	9月29～10月1日	9月23～25日	10月10日
抜取調査	10月2～3日	9月25～27日	10月12日

# 臨時営農情報<第5報>

【 2枚目 】

## 長いも

☆台風18号による強風の影響で、ネットの落下（上糸の切断）、ネットの破損、落葉が発生し、茎葉の傷み、一部つる切れ症状も見られます。

ネットや支柱の早期復旧作業を行い、薬剤散布により、病害虫の発生を防ぎましょう。

〈葉面散布〉 ※茎葉の回復と早期完成を図る。  
メリット赤（300～400倍）

〈葉渋病・炭そ病〉 ※炭疽病、急増中です。  
アミスター20フロアブル（2,000倍・収穫前日・3回）  
トップジンM水和剤（800倍・収穫7日前・5回）  
ベルコートフロアブル（1,000倍・収穫7日前・5回）  
ラビライト水和剤（400倍・収穫14日前・4回）

〈ナガイモコガ〉 ※発生が多く食害が目立ちます。  
モスピラン顆粒水溶剤（4,000倍・収穫7日前・3回）  
トレボン乳剤（1,000倍・収穫14日前・3回）  
プレバソフアブル5（2,000倍・収穫前日・3回）

〈アブラムシ〉 ※種子ほ場の防除は継続する！  
アクタラ顆粒水溶剤（3,000倍・収穫7日前・3回）  
ウララDF（2,000倍・収穫7日前・2回）

## ごぼう

★太が多くならないように試し掘りをして適期収穫し、出荷の平準化に努めましょう。

☆異物混入がないよう今一度確認しましょう！

〈黒斑細菌病〉  
カスミンボルドー（1,000倍・収穫14日前・3回）

〈菌核病〉  
ロブラール水和剤（1,000倍・収穫3日前・3回）

〈葉面散布〉  
メリット青（300～400倍）

◎アブラムシ類  
ウララDF（2,000～4,000倍・収穫7日前・2回）  
アグロスリン乳剤（2,000倍・収穫14日前・5回）  
〈追肥〉 S646を10a当り1～2袋施用する。

## 大根

★害虫防除

ハチハチ乳剤（1,000～2,000倍・収穫14日前・2回）

アグロスリン水和剤（1,000～2,000倍・収穫7日前・5回）

★軟腐病 カセット水和剤（1,000倍・収穫14日前・3回）

★白さび病・ワッカ症

ランマンフロアブル（2,000倍・収穫3日・3回）

## 人参

★黒葉枯病、斑点病、うどんこ病  
シグナムWDG（2,000倍・収穫14日前・2回）

★黒葉枯病  
ポリオキシシンAL水和剤（500倍・収穫7日前・5回）

★ヨトウムシ、アブラムシ類  
ランネート45DF（1,000倍・収穫前日・2回）

週間天気	9月20日 (水)	9月21日 (木)	9月22日 (金)	9月23日 (土)	9月24日 (日)	9月25日 (月)
信頼度	/	/	A	C	B	B
降水確率 (%)	50	20	0	30	10	10
最高気温 (°C)	27	24	23	23	23	23
最低気温 (°C)	17	15	13	15	14	13

### 平成29年度「ながいも育成塾」(第1回)開催

○日時・会場 平成29年9月21日(木) 17:00～18:30 JA おいらせ本店 2階 会議室  
○開催内容 ①極小種子の生育状況を把握、②現地試験(種子別生育)の状況、③情報提供

※一般生産者も参加できますので、ぜひ受講下さい。

発行元 上北県民局三沢分室・三沢市・六戸町・JAおいらせ